

PERACETICFOOD

Desinfetante para Indústria Alimentícia e Afins



Propriedades e Utilizações

PERACETICFOOD é um desinfetante à base de Ácido Peracético (15%), indicado para desinfecção por sistema CIP e COP de tubulações, carbonatadores, trocadores de calor, enchedoras, pasteurizadores, tanques, equipamentos de ordenha e processadores de carne, câmaras frias, etc., além de desinfecção de superfícies e de ambientes pelo método de pulverização, desde que utilizados os equipamentos de segurança adequados.

PERACETICFOOD também é recomendado para desinfecção de frutas, legumes, verduras, ovos, utensílios e ambientes.

PERACETICFOOD é ideal para indústrias alimentícias e áreas de manipulação de alimentos, como: laticínios, frigoríficos, indústria de bebidas, granjas, indústria de pescados, cozinhas industriais, restaurantes, supermercados, empresas de beneficiamento de frutas, legumes e verduras, etc.

PERACETICFOOD é eficaz contra bactérias gram-positivas e gram-negativas. Não causa corrosão em aço inox (304 ou 316), plástico, vidro, teflon, borracha nitrílica, nas concentrações de uso recomendadas.

Informações Técnicas

CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICAS

Aparência: Líquido Transparente

Cor: Incolor

Odor: Característico

pH: 0,0 - 2,0

COMPOSIÇÃO: Peróxido de Hidrogênio, ácido acético, sequestrante, coadjuvante, veículo e estabilizante.

PRINCÍPIO ATIVO: Ácido Peracético: 15,0%.

EMBALAGENS

2x5 L, 20 L e 50 L

REGISTRO MS:

3.0018.0174

Instruções de Uso

Em todas as aplicações utilize o produto em temperatura ambiente.

Desinfecção por sistema CIP:

Circular o produto PERACETICFOOD, na diluição de 0,1% (1:1000) a 0,2% (1:500), por 10 minutos.

Desinfecção de superfícies e utensílios:

Utilizar o produto PERACETICFOOD, na diluição de 0,1% (1:1000) a 0,2% (1:500), por 10 minutos.

Desinfecção de frutas, legumes, verduras e ovos:

Utilizar PERACETICFOOD, na diluição de 0,1% (1:1000) por 60 segundos, em seguida deixe escorrer.

Desinfecção de ambientes:

1. Nebulizar PERACETICFOOD na diluição de 0,1% (1:1000).

- O tempo de ação dependerá das instruções fornecidas pelo fabricante do equipamento, sendo no mínimo, 10 minutos.
- Utilizar os EPI's indicados para esse processo.
- Não nebulizar o produto no ambiente com a presença de alimentos ou de pessoas que não estejam devidamente paramentadas com os EPI's.
- Após nebulização, aguardar tempo suficiente para a deposição de aerossóis nas superfícies, portanto a área deverá permanecer vazia entre 1 ou 2 horas ou de acordo com as instruções do fabricante do equipamento.
- **Obs:** Ao utilizar PERACETICFOOD na concentração de 0,1% (1:1000), não é necessário enxaguar.
- É recomendado drenar a solução de produto completamente.
- Para a utilização do PERACETICFOOD em concentrações maiores que 0,1% (1:1000), é recomendado o enxágue após tempo de contato indicado.

Garantia

A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.

